

Tájékoztató fogsabályozó kezelésről

Önnek, illetve az Ön gyermekének fogsabályozó kezelésre van szüksége. Ezt hibás állású fogai vagy nem megfelelően fejlődő állcsontjai teszik szükségessé. A kezelés célja a növekedést és a fogak helyzetét *kedvező irányba megváltoztatva, szebb és funkcióképesebb fogazat* létrehozása, mert a kezelés elmaradása az állapot súlyosbodását okozhatja és nemcsak esztétikai hátrányai lehetnek, hanem fogászati betegséget (pl.: fogszuvasodás, fogínysorvadás, állkapocs izületi panaszok) is okozhat.

A kezelés fogsabályozó készülékekkel történik, melynek kivehető és beragasztott változatai vannak. Hogy melyiket kell alkalmazni, azt az *adott fogazati eltérés és az életkor* dönti el.

A készüléket a kapott utasításnak megfelelően kell hordani és időről időre, átlagosan *havonta* kontroll vizsgálaton kell megjelenni a készülék utánállítására céljából.

A kezelés több évig tarthat, tehát komoly időráfordítást, együttműködést, türelmet igényel, anyagi terhei sem elhanyagolhatóak.

A kezelési idő megszakítása problémát jelenthet, mert a nem befejezett kezeléssel elért állapot talán rosszabb, mint a kiinduló volt.

Mint minden orvosi tevékenységnek, a fogsabályozásnak is lehetnek kockázatai, előre nem látható hatásai. A készülékviselés ideje alatt a fogszuvasodási hajlam fokozódik, ezért a megfelelő fogápolás elengedhetetlen. Átmeneti fájdalom léphet fel, de ez általában múló kellemetlenség. A kezelés során a fogak meglazulnak, a kezelés befejezése után az új helyükön szilárdulnak meg, de ez néha nem teljesen következik be és az elért eredmény nem stabil. Kisebb vagy közepes méretű gyökérfelszívódás is létrejöhet. Az állkapocs ízület nem mindig alkalmazkodik az új helyzethez, ezért izületi fájdalom, kattogás is felléphet időlegesen vagy véglegesen.

A fogsabályozás mellékhatásai összefoglalva:

- fogszuvasodás
- gyökérfelszívódás
- nyálkahártya változás
- ideiglenes foglazulás
- fokozott érzékenység a kezelés alatt
- gyökérkezelt fog törése a rögzített készülék eltávolításakor
- rossz közreműködés esetén kevés vagy nem megfelelő eredmény
- a kezelés befejezése után visszarendeződés

A fenti mellékhatások és szövődmények szerencsére ritkán lépnek fel és minden megteszünk elkerülésük érdekében. Panasz esetén kérjük a rendelőt mielőbb felkeresni.

Ha a páciens együttműködése nem megfelelő

- nem hordja a kivehető készüléket
- nem használja az előírt intermaxilláris gumikat
- nem tartja be az étkezési előírásokat és ezért sorozatosan lejönnek a felragasztott bracketek
- nem hordja az előírt helybentartó készüléket
- nem jelenik meg a kontrollokon

akkor a kezelőorvos a további károsodások elkerülése érdekében a kezelés megszakítását indíthatja.

A fogsabályozó kezelés mindig lenyomatvétellel, 2 db röntgen felvétel (panoráma, tele rtg) készítésével, fotódokumentációval és ezek alapján kezelési terv készítésével indul.

Kérjük, hogy betegen (láz, nátha, köhögés, hasmenés, herpesz fertőzés) ne jöjjenek kontrollra, ez esetben szíveskedjenek új időpontot kérni.

A fenti tájékoztatást tudomásul vettem, a kérdéseimre megfelelő és érthető választ és felvilágosítást kaptam. A rám háruló feladatokat vállalom, a kezelésbe beleegyezem.

Dátum:

.....
páciens

.....
kezelőorvos